

АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМБИНАЦИИ **ЦЕЛЕКОКСИБА И УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ**

- 1. Лечение дисфункции желчного пузыря (ДЖП) по гипомоторному типу (с болевым синдромом) и с целью профилактики хронического некалькулезного холецистита – Целебрекс (целекоксиб) – по 100 мг 2 раза в день после еды – 5-7 дней, после чего Урсофальк или Урсосан (урсодезоксихолевая кислота) – по 750 мг 1 раз в день на ночь – 2 недели. Эффективность – 95%.**
- 2. Лечение хронического некалькулезного холецистита (ХНХ) без билиарного сладжа (с болевым синдромом) и с целью профилактики хронического некалькулезного холецистита с билиарным сладжем, дуоденогастрального рефлюкса, атрофического гастрита антрального отдела желудка и хронического билиарного панкреатита – Целебрекс (целекоксиб) – по 100 мг 2 раза в день после еды – 5-7 дней, после чего Урсофальк или Урсосан (урсодезоксихолевая кислота) – по 750 мг 1 раз в день на ночь – 1 месяц. Эффективность – 95%.**
- 3. Лечение хронического некалькулезного холецистита (ХНХ) с билиарным сладжем (с болевым синдромом) и с целью профилактики хронического калькулезного холецистита, дуоденогастрального рефлюкса, атрофического гастрита антрального отдела желудка и хронического билиарного панкреатита – Целебрекс (целекоксиб) – по 100 мг 2 раза в день после еды – 5-7 дней, после чего Урсофальк или Урсосан (урсодезоксихолевая кислота) – по 750 мг 1 раз в день на ночь – 2 месяца. Эффективность – 95%.**
- 4. Лечение хронического калькулезного холецистита (ХКХ) (с болевым синдромом) и с целью профилактики острого калькулезного холецистита, дуоденогастрального рефлюкса, атрофического гастрита антрального отдела желудка и хронического билиарного панкреатита – Целебрекс (целекоксиб) – по 100 мг 2 раза в день после еды – 5-7 дней, после чего Урсофальк или Урсосан (урсодезоксихолевая кислота) – по 750 мг 1 раз в день на ночь – 3 месяца. Предполагаемая эффективность – 90-95%.**
- 5. Лечение больных после перенесенной холецистэктомии (ППХЭ – постхолецистэктомический синдром – дисфункция или недостаточность сфинктера Одди) (с болевым синдромом) и с целью профилактики холедохолитиаза, дуоденогастрального рефлюкса, атрофического гастрита антрального отдела желудка и хронического билиарного панкреатита – Целебрекс (целекоксиб) – по 100 мг 2 раза в день после еды – 5-7 дней, после чего Урсофальк или Урсосан (урсодезоксихолевая кислота) – по 750 мг 1 раз в день на ночь – 2 месяца. Предполагаемая эффективность – 90-95%.**
- 6. Лечение дуоденогастрального рефлюкса и атрофического гастрита антрального отдела желудка (реактивный гастрит или желчный гастрит) – Целебрекс (целекоксиб) – по 100 мг 2 раза в день после еды – 5 дней, после чего Урсофальк или Урсосан (урсодезоксихолевая кислота) – по 750 мг 1 раз в день на ночь – 2 недели. Предполагаемая эффективность – 90-95%.**
- 7. Лечение хронического билиарного панкреатита – дополнительно к базовой схеме лечения – Целебрекс (целекоксиб) – по 100 мг 2 раза в день после еды – 7-10 дней и Урсофальк или Урсосан (урсодезоксихолевая кислота) – по 750 мг 1 раз в день на ночь – 1 месяц. Предполагаемая эффективность – 90-95%.**

Патогенетическая коррекция метаболических и морфо-функциональных нарушений в желчном пузыре и печени у больных ДЖП позволяет снизить риск возникновения хронического некалькулезного холецистита, у больных ХНХ позволяет снизить риск образования желчных камней в желчном пузыре, у больных ХКХ позволяет снизить риск возникновения острого калькулезного холецистита, у больных ППХЭ позволяет снизить риск развития холедохолитиаза. **Все это позволяет остановить рост заболеваемости, уменьшить количество больных с ДЖП, ХНХ, ХКХ и ОКХ на 20-40%, и улучшить качество жизни больных после перенесенной холецистэктомии.**

АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМБИНАЦИИ ЦЕЛЕКОКСИБА, УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ И ХОФИТОЛА:

- 1. Лечение дисфункции желчного пузыря (ДЖП) по гипомоторному типу (с болевым синдромом) и с целью профилактики хронического некалькулезного холецистита – Целебрекс (целекоксиб) по 100 мг х 2 раза в день (5 дней) + Урсофальк или Урсосан (урсодезоксихолевая кислота) – по 750 мг 1 раз в день на ночь + Хофитол по 400 мг 3 раза в день (10 дней) – весь курс 10 дней.**
- 2. Лечение хронического некалькулезного холецистита (ХНХ) без билиарного сладжа (с болевым синдромом) и с целью профилактики хронического некалькулезного холецистита с билиарным сладжем, дуоденогастрального рефлюкса, атрофического гастрита антрального отдела желудка и хронического билиарного панкреатита – Целебрекс (целекоксиб) по 100 мг х 2 раза в день (7 дней) + Урсофальк или Урсосан (урсодезоксихолевая кислота) – по 750 мг 1 раз в день на ночь + Хофитол по 400 мг 3 раза в день (14 дней) – весь курс 14 дней.**
- 3. Лечение хронического некалькулезного холецистита (ХНХ) с билиарным сладжем (с болевым синдромом) и с целью профилактики хронического калькулезного холецистита, дуоденогастрального рефлюкса, атрофического гастрита антрального отдела желудка и хронического билиарного панкреатита – Целебрекс (целекоксиб) по 100 мг х 2 раза в день (7-10 дней) + Урсофальк или Урсосан (урсодезоксихолевая кислота) – по 750 мг 1 раз в день на ночь + Хофитол по 400 мг 3 раза в день (28 дней) – весь курс 28 дней.**
- 4. Больные с холестериновым холецистолитиазом – Целебрекс (целекоксиб) по 100 мг х 2 раза в день (7-10 дней) + Урсофальк или Урсосан (урсодезоксихолевая кислота) – по 750 мг 1 раз в день на ночь + Хофитол по 400 мг 3 раза в день (90 дней) + УДХК по 750 мг 1 раз в день (90 дней) – весь курс 90 дней.**
- 5. Лечение больных после перенесенной холецистэктомии (ППХЭ – постхолецистэктомический синдром – дисфункция или недостаточность сфинктера Одди) (с болевым синдромом) и с целью профилактики холедохолитиаза, дуоденогастрального рефлюкса, атрофического гастрита антрального отдела желудка и хронического билиарного панкреатита – Целебрекс (целекоксиб) по 100 мг х 2 раза в день (7-10 дней) + Урсофальк или Урсосан (урсодезоксихолевая кислота) – по 750 мг 1 раз в день на ночь + Хофитол по 400 мг 3 раза в день (28 дней) – весь курс 28 дней.**

АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМБИНАЦИИ ЦЕЛЕКОКСИБА И ХОФИТОЛА ИЛИ ГЕПАТОФАЛЬК ПЛАНТА:

- 1. Лечение дисфункции желчного пузыря (ДЖП) по гипомоторному типу (с болевым синдромом) и с целью профилактики хронического некалькулезного холецистита – Целебрекс (целекоксиб) по 100 мг х 2 раза в день (5 дней) + Хофитол по 400 мг 3 раза в день (10 дней) или Гепатофальк планта по 400 мг 3 раза в день (10 дней) – весь курс 10 дней.**
- 2. Лечение хронического некалькулезного холецистита (ХНХ) без билиарного сладжа (с болевым синдромом) и с целью профилактики хронического некалькулезного холецистита с билиарным сладжем, дуоденогастрального рефлюкса, атрофического гастрита антрального отдела желудка и хронического билиарного панкреатита – Целебрекс (целекоксиб) по 100 мг х 2 раза в день (7 дней) + Хофитол по 400 мг 3 раза в день (14 дней) или Гепатофальк планта по 400 мг 3 раза в день (14 дней) – весь курс 14 дней.**
- 3. Лечение хронического некалькулезного холецистита (ХНХ) с билиарным сладжем (с болевым синдромом) и с целью профилактики хронического калькулезного холецистита, дуоденогастрального рефлюкса, атрофического гастрита антрального отдела желудка и хронического билиарного панкреатита – Целебрекс (целекоксиб) по 100**

мг х 2 раза в день (7-10 дней) + Хофитол по 400 мг 3 раза в день (28 дней) или Гепатофальк планта по 400 мг 3 раза в день (28 дней) – весь курс 28 дней.

4. **Больные с холестериновым холецистолитиазом** – Целебрекс (целекоксиб) по 100 мг х 2 раза в день (7-10 дней) + Хофитол по 400 мг 3 раза в день (90 дней) + УДХК по 750 мг 1 раз в день (90 дней) – весь курс 90 дней.
5. **Лечение больных после перенесенной холецистэктомии (ППХЭ – постхолецистэктомический синдром – дисфункция или недостаточность сфинктера Одди) (с болевым синдромом)** и с целью профилактики холедохолитиаза, дуоденогастрального рефлюкса, атрофического гастрита антрального отдела желудка и хронического билиарного панкреатита – Целебрекс (целекоксиб) по 100 мг х 2 раза в день (7-10 дней) + Хофитол по 400 мг 3 раза в день (28 дней) или Гепатофальк планта по 400 мг 3 раза в день (28 дней) – весь курс 28 дней.

Внимание!!! Информация для больных:

Перед использованием представленных схем лечения убедительная просьба посмотреть противопоказания (см. ниже) и побочные эффекты при применении фармакологических препаратов Целебрекса (целекоксиба), Урсофалька или Урсосана (урсодезоксихолевой кислоты), Хофитола, Гепатофалька планта и получить разрешение у вашего лечащего врача.

Противопоказания для применения Целебрекса (целекоксиба):

- аллергические реакции (крапивница, бронхоспазм) на прием ацетилсалициловой кислоты или других НПВС (в анамнезе);
- III триместр беременности;
- известная повышенная чувствительность к сульфонамидам;
- повышенная чувствительность к любому компоненту препарата.

Противопоказания для применения Урсофалька или Урсосана (урсодезоксихолевой кислоты):

- повышенная чувствительность к препарату;
- острые воспалительные заболевания желчного пузыря и желчных протоков;
- неспецифический язвенный колит;
- болезнь Крона.

Противопоказания для применения Хофитола или Гепатофальк планта:

- желчнокаменная болезнь;
- непроходимость желчных путей;
- индивидуальная непереносимость.

Сайт не несет юридической ответственности за использование представленных схем лечения без согласования с лечащим врачом.